

Инструкция по применению препарата Скотный Двор Глубокая подстилка для коров

В качестве материала можно использовать солому, опилки (не пылящие и не содержащие формальдегидов), шелуху и другие виды подходящих органических отходов (торф не рекомендуется).



Соломенная подстилка работает до 1,5 лет, опилки и смеси соломы и опилок - до 2 лет. Наилучший результат при использовании опилок и соломы равными слоями. При применении гранул необходимо добавить к ним соломы.

Препарат Глубокая подстилка для коров подходит также для лошадей, коз, овец, кроликов, собак, кошек, нутрий и других млекопитающих.

Биоактиватор соответствует всем требованиям европейской экологической безопасности и может применяться в непосредственном контакте с животными.

Пол стойла должен быть с уклоном, температура в помещении +1°C и выше. На пол кладут 30-40 см соломы, опилок или шелухи. Потом высыплют нужную дозу препарата на солому (можно рассыпать через сито для более равномерного распределения или смешать с отрубями, шротом, мукой и т.п. для удобства и ускорения роста микроорганизмов). Потом ставят на солому животных, моча и навоз начинают активировать бактерии препарата. Через 1-2 дня сверху надо досыпать еще 30 см соломы и снова сверху повторно обработать препаратом. Теперь подстилка готова и «заряжена» сверху и в середине, начинается ее разогрев. Сверху по мере утаптывания и необходимости добавляют свежую солому. Если толщина подстилки маленькая, запах устраняется, но ее разогрев происходит начиная от толщины уплотненной подстилки в 30-40 см. Через 1,5-2 года подстилку убирают с помощью техники, её сразу можно вносить на поля, избежав длительного хранения навоза для его нейтрализации.

Доза препарата на 1 м² подстилки составляет и 10гр для коров при привязном содержании. Повторность обработок - один раз в 2-4 недели. Дозировка меняется в разных по загрязненности зонах и плотности содержания животных. Для расчёта дозировок просим обращаться в нашу службу поддержки.

Отработанная подстилка может применяться в качестве удобрения сразу после удаления из коровника. Полезные бактерии заселяют подстилку по всей глубине и вытесняют патогенных «конкурентов». Для профилактики маститов необходимо вносить препарат еженедельно и не обездвиживать коров. Можно избежать постоянного кормления животных антибиотиками.